

schülke →

ПРОЗРАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Октенисепт® как средство для профилактики и лечения вагинальных инфекций, а также в комплексной терапии.

- Вагиниты (неспецифические), вульвовагинальный кандидоз, трихомоноз, хламидиоз, генитальный герпес и т.д.
- Лечит симптомы зуда, жжения и выделений в области влагалища, которые обусловлены бактериями.
- Возможность использования в профилактике и лечении вагинитов различной этиологии у беременных женщин со сроком беременности 16 недель и более и впоследствии у женщин в период лактации.
- Раствор бесцветный, следовательно, не пачкает и не красит.
- Подавляет бактерии, включая хламидии и микоплазму, грибы и дрожжи, простейшие (трихомонады), вирусы (простой герпес, гепатиты В и С, ВИЧ).



the plus of pure
performance

Октенисепт® как средство для лечения вагинальных инфекций



Наше преимущество

- оптимальное увлажнение слизистой оболочки
- никаких ограничений в применении у беременных с 4 месяцев
- бесцветный

Область применения

Лечение и ослабление симптомов зуда, жжения и выделений в области влагалища, которые обусловлены бактериями и вагинальными инфекциями.

Указания по применению

В первый день лечения вводить вагинальный аппликатор глубоко во влагалище утром и вечером, а впоследствии один раз в день – вечером, препарат вводить 10-кратным нажатием колпачка аппликатора. Продолжительность лечения составляет 7 дней. Во избежание новой инфекции партнер тоже должен быть вовлечен в процесс лечения. Для этого необходимо препаратом без аппликатора с надетой распылительной насадкой обильно смочить мужские гениталии.


При устойчивости симптомов и рецидивах необходимо гинеко-

1. Перед первым применением достаньте аппликатор из упаковки и наденьте его после снятия защитного колпачка (a) и распылительной насадки (b) на флакон Октенисепта® (c).

2. Распылительный механизм работает в любом положении флакона (вертикальном или с направленным вниз колпачком аппликатора).




3. Рекомендуется вводить аппликатор глубоко во влагалище, сидя на унитазе или лежа в постели. Теперь нажмите 10 раз указательным пальцем на колпачок аппликатора так, чтобы препарат глубоко орошал влагалище.



4. После применения вымойте аппликатор снаружи и распылите еще раз немного препарата направленным вниз аппликатором, например над раковиной. Теперь Вы можете оставить препарат до следующего применения.



5. Перед очередным применением распылить один или два раза из направленного вниз аппликатора и снова проделать весь описанный выше процесс.



логическое обследование, включающее в себя микробиологическую диагностику и, в случае необходимости, лечение антибиотиками или противогрибковыми антибиотиками.

Микробиологическая активность

Октенисепт® как средство для лечения вагинальных инфекций подавляет бактерии, включая хламидии и микоплазму, грибы и дрожжи, простейшие (трихомонады), вирусы (Herpes simplex, гепатит В и С, ВИЧ).

Данные о препарате

Состав: 100 г раствора содержат действующие вещества: 0,1 г октенидиндигидрохлорида, 2,0 г феноксиэтанола.

Особые указания:

- При промываниях ран необходимо обратить внимание на то, чтобы препарат наносился на ткани без давления.
- При промываниях раневой полости необходимо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен постоянный отток (дренаж).
- Октенисепт противопоказан при промываниях брюшной полости (напр., во время операций) мочевого пузыря, а также на барабанной перепонке.
- Не глотать. Не допускать попадания большого количества Октенисепта в кровь, например, при случайном попадании при инъекциях.
- Не смешивать Октенисепт с другими препаратами.
- Не применять Октенисепт с антисептиками на основе PVP-йода на прилегающих участках кожи, так как это может привести к сильным изменениям цвета кожи: от коричневого до фиолетового.
- Повязки, инцизные пленки можно накладывать только после полного высыхания Октенисепта.
- Во время применения Октенисепта в редких случаях может наблюдаться чувство жжения, которое быстро проходит.
- Октенисепт можно нагревать до температуры тела.
- Не применять Октенисепт после истечения срока годности. После вскрытия флакона использовать препарат не более 3 лет, не превышая указанного срока годности.
- Хранить Октенисепт в местах недоступных для детей.

Представительство Шюльке & Майр в СНГ и России

119606 Москва, Проспект Вернадского 84, 2-ой гостиничный корпус
Тел: +7(495)436-06-38, +7(495)436-02-28, эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru
Сайт: www.schulke.ru

www.schuelke.com

Partner of

